Způsob použití: Do aplikátoru s názvem InDERM dávkujte přípravek v množství dle tabulky. InDERM přiložte kolmo na vrásku a velmi lehkým přítlakem vtlačte roztok do vráskové rýhy. Zbytky roztoku pečlivě vmasírujte do oblasti vrásky. Následně můžete ošetřená místa krýt Mořskou alginátovou maskou zjemňující s chlorofylem (138). Do 20 minut po aplikaci naneste vhodný SynCare krém bez parfému a konzervačních látek dle typu pleti klienta.

Nežádoucí reakce: Přípravek je schválen jako kosmetický prostředek. Na přípravek nebyly zaznamenány v průběhu jeho schvalování žádné nežádoucí reakce. Přípravek byl testován na pokožce zdravých osob. Přesto nelze vyloučit mírné dráždění a začervenání v místech aplikace krátce po nanesení. V případě, že budou tyto reakce přetrvávat nebo se objeví jiné dle Vašeho názoru nežádoucí účinky, kontaktujte Ambulanci estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz, tel: 7 333 777 99, e-mail: ambulance@syncare.cz.

Upozornění: Doporučte klientce, aby se několik dnů po aplikaci vyhýbala příliš vysokým nebo nízkým teplotám a UV záření včetně slunce.

Kombinace s jinými přípravky SynCare: Alepoň 3 dny po apliakci nedoporučujme používat Práškovou Thermo masku, BIOMINERAL Bahenní masku, Čisticí masku, Enzymový peeling a AHA přípravky. Ostatní přípravky SynCare je možné bez omezení používat. Nejvhodnější pro udržení účinku je DermaBOTEXIN krém.

Doporučený způsob dávkování v péči proti vráskám

délka vrásky	do 3 cm	do 5 cm	více jak 5 cm
dávka	0,15 ml	0, 20 ml	0,30 - 0,40 ml

Doporučený způsob dávkování pro vypnutí a hydrataci pleti

místo	okolí úst	čelo	čelo+tváře	čelo+tváře+krk
dávka	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml	1 ml

Při dávkování pro hydrataci a vypnutí pleti se InDERM používá pouze pro nadávkování z ampule a pro aplikaci na pleť. Roztok se následně prsty vmasíruje.